


ยุ่งลาย กับ โรคไข้วัดข้อยุงลาย




โรคไข้วัดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุ่งลาย เป็นพาหะ อาการไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่! อาการปวดข้ออาจจะต้อง ใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะหาย กลุ่มอาการคล้ายโรคไข้วัดออก แต่ต่างกันที่ไม่มีการรั้วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่พบ ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงมีการช็อก



อาการของโรคไข้วัดข้อยุงลาย

- มีไข้สูงอย่างฉับพลัน ประมาณ 40 องศาเซลเซียส



- มักเป็นร่วมกับอาการอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น มีผื่นแดง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก ข้อ กระบองตา หรือมีเลือด ออกตามผิวหนัง



- อาจมีอาการคันร่วมด้วย



- อาการจะมีลักษณะคล้าย โรคไข้วัดออก และหัดเยอรมัน แต่ไม่มีอาการรุนแรงถึงขั้น ช็อกจนเสียชีวิต



- เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่ ผู้ใหญ่จะมีอาการปวด ที่รุนแรงกว่า



- อาการปวดอาจหายได้ ภายใน 1-12 สัปดาห์



การรักษา

โรคไข้วัดข้อยุงลายยังไม่มีวัคซีนสำหรับการรักษาจำเพาะ แต่จะใช้ การรักษาตามอาการ เช่น อาการปวดข้อ อาการไข้ ดังนี้

1. กินยาแก้ปวด เพื่อลดไข้ (ไม่ควรใช้ ยาแอสไพริน หรือไอบรูโพรเฟน เนื่องจากจะทำให้เกล็ดเลือดผิดปกติและระคายเคาะอาหาร)



2. ดื่มน้ำและนอนหลับ พักผ่อนให้พอเพียง



3. เช็ดตัวด้วยน้ำสะอาด เพื่อช่วยลดไข้



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

3 เก็บ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ

3 โรค โรคไข้วัดออก โรคติดเชื้อไวรัสชิคากา โรคไข้วัดข้อยุงลาย

สำนักโรคติดต่อหน้าโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

www.thaivbd.org

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

Genesis PTA3_04